1917 — N° 2

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE

DE FRANCE

FONDÉE LE 29 FÉVRIER 1832

RECONNUE COMME INSTITUTION D'UTILITÉ PUBLIQUE

PAR DÉCRET DU 23 AOÛT 1878

Natura maxime miranda in minimis.

PARIS

AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

HÔTEL DES SOCIÉTÉS SAVANTES

28, Rue Serpente, VIe

1917

Le Bulletin paraît deux fois par mois.

Librairie de la Société entomologique de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les **membres** de la Société, le deuxième, pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales *de la Société entomologique de France*, années 1843 à 1845, 1859 à 1870, 1872 à 1879 et 1883 à 1895. . . . . 12 et 15 fr.
Annales (années 1896 à 1914). . . . . 25 et 30 fr.
Tables *des Annales* (**1832-1860**), par A.-S. Paris . 2 et 3 fr.
Tables *des Annales, de* **1861** *à* **1880**, par E. Lefèvre. 10 et 12 fr
Tables *des Annales, de* **1881** *à* **1890**, par E. Lefèvre. 7,50 et 10 fr.
Bulletin *de la Société entomologique de France* (publication distincte des *Annales*, depuis 1896), années 1896 à 1915, chaque année . . . . . 18 fr.
Bulletin (numéros isolés), chaque. . . . . 1 et 1 fr.
Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. Nos). 5 et 5 fr.
L'Abeille (série in-12), la plupart des volumes, chacun. 8 et 12 fr.
L'Abeille (série in-8o), 1892-1906, prix de l'abonnement *par volume* (port compris). . . . . 10 et 12 fr.
Faune *des Coléoptères du bassin de la Seine*, par L. Bedel :
Vol. I (*Carnivora, Palpicornia*) . . . . . (*Épuisé*)
Vol. II (*Staphylinoidea*, 1re part.) (par J. Ste-Claire Deville). . . . . 3 et 4 fr.
Vol. IV, 1er fascicule (*Scarabaeidae*) . . . . . 4 et 5 fr.
Vol. V (*Phytophaga*). . . . . 8 et 10 fr.
1er fascicule seul. . . . . 3 et 4 fr.
2e fascicule seul. . . . . 5 et 6 fr.
Vol. VI (*Rhynchophora*) . . . . . (*Épuisé*)
2e fascicule seul . . . . . 5 et 6 fr.
Catalogue raisonné *des Coléoptères du Nord de l'Afrique*, par L. Bedel, 1er fasc., pp. 1-208, in-8o, 1895-1900. . . . . 10 et 12 fr.
Mémoires entomologiques (*Études sur les Coléoptères*), par A. Grouvelle, fasc. 1 (1916), pp. 1-80. 3 et 4 fr.

Synopsis des Onthophagides d'Afrique, par H. d'Orbigny. 20 et 25 fr.
Les zoocécidies du Nord de l'Afrique, par C. Houard . . 8 et 10 fr.

EXTRAITS DE *L'ABEILLE*

Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Anc. Monde, par S. de Marseul, 1889, in-12 . . . . . 3 et 4 fr.
Catalogus Coleopterorum Europae et confinium, 1866, in-12. 0 fr. 50
Id. avec Index (*Suppl. au Catalogus*), 1877, in-12. 1 fr. 25
Les Entomologistes et leurs écrits, par de Marseul, in-12. 8 et 10 fr.
Etude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Méditerranée, par Peyron, 1877, in-12. . . . . 4 et 5 fr.
Mylabrides d'Europe (*Monogr. des*), par S. de Marseul, 1870, in-12, 2 planches coloriées : 5 et 6 fr.; noires : . . . . . 4 et 5 fr.

Librairie de la Société entomologique de France (*suite*).

Silphides (*Précis des genres et espèces des*), par S. DE MARSEUL, 1884, in-12. . . . . 3 et 4 fr.

Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Pselaphides et Scydmenides, par REITTER (trad. E. Leprieur), 1883, in-12. . . . . 3 et 4 fr.

Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces de l'Ancien Monde, par S. DE MARSEUL :

Hydrocanthares Palpicornes, 1882, in-12. . . . . 3 et 4 fr.

Buprestides, 1889, in-12. . . . . 1 et 2 fr.

Oedémerides (*Synopse des*), par GANGLBAUER (traduction de Marseul), 1887, in-12. . . . . 1 et 2 fr.

Ditomides (*Monogr. des*), par P. DE LA BRULERIE, 1873, in-12. 2 et 3 fr.

Eumolpides (*Synopse des*), par E. LEFÈVRE (Appendice par DE MARSEUL), 1876, in-12. . . . . 1 et 2 fr.

Histérides de l'Archipel malais et indo-chinois, par S. DE MARSEUL, 98 p., 1864, in-12. . . . . 1 fr.

Magdalinus d'Europe et circa, par DESBROCHERS DES LOGES, 1870, in-12. . . . . 1 50 et 2 fr.

Nanophyes (*Monogr. du genre*), par H. BRISOUT DE BARNEVILLE, 1869, in-12. . . . . 1 50 et 2 fr.

Erotylides et Endomychides de l'Ancien Monde (*Revision des*), *d'après les travaux de M. E. Reitter*, 1889, in-12. . . 1 50 et 2 fr.

Glaphyrus (*Monogr. du genre*), par HAROLD (traduction A. Preud'homme de Borre), 1870, in-12. . . . . 0 fr. 50

Oxyporus (*Tableau synopt. du genre*), par A. FAUVEL, 1864, in-12. . . . . 0 fr. 50

Malthinides de l'Ancien Monde (*Monogr. des*), par S. DE MARSEUL, 120 p., 1877, in-12. . . . . 3 et 4 fr.

Trichopterygiens (*Synopse des espèces de*), par MATTHEWS 75 p., 1878, in-12. . . . . 3 et 4 fr.

Apionides (*Monographie des*), par WENCKER, 162 p., 1864, in-12 . . . . . 4 et 5 fr.

Téléphorides (*Monographie des*), par S. DE MARSEUL, 108 p., 1864, in-12. . . . . 3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux Stenosis, par ED. REITTER, in-12, 50 p. (Extr. Gazette ent. Allem., XXX, 1866). . . . . 1 50 et 2 fr.

Le genre Aëpophilus, par V. SIGNORET, in-8°, 3 p., 1 pl. col. (Extr. Tijdschr. voor. Ent., vol. XXIII, 1879-80). 1 et 1 50

[Voir la suite à la page 6 de la couverture.]

AVIS TRÈS IMPORTANTS

Annales. — Le 3e trimestre des *Annales* de 1916 a paru le 10 janvier 1917.

Le Trésorier rappelle que les *Annales* de 1916 ne seront envoyées qu'aux membres de la Société qui auront payé la cotisation de l'année. Il prie donc ses collègues de se mettre en règle le plus tôt possible, en lui faisant parvenir leur cotisation.

Il est à leur disposition pour la recevoir tous les jours de semaine de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, VIIe, et à toutes les séances de la Société, 28, rue Serpente.

Tous les envois d'argent faits à la Société par lettres chargées, mandats-poste ou chèques payables à Paris, *doivent être libellés au nom de* **M. Ch. Lahaussois**, Trésorier, et non autrement, pour éviter les difficultés d'encaissement d'envois impersonnels.

Les envois peuvent lui être faits soit à son domicile, 2, rue de La Planche, Paris, VIIe, soit au siège de la Société.

L'Abeille. — Le 4e fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Avis. — La Bibliothèque de la Société est ouverte : pour renseignements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y travailler : les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2, et les mercredis, de 8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. — Entretien de collections et soufflage de chenilles. — Préparations microscopiques.

Mlle C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (Ve).

Envoi du tarif sur demande.

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 24 janvier 1917

Présidence de M. H. DESBORDES.

Correspondance. — M. P. CAUSSOU, admis à titre de membre assistant, remercie la Société de son admission.

Changement d'adresse. — M. le Dr M. BOITEL, médecin-major de 1re classe, hôpital de campagne, Casablanca (Maroc occidental).

Legs Thierry-Mieg. — Le Président annonce que M. Paul THIERRY-MIEG, décédé dans les derniers jours de 1916, a voulu laisser à la Société un souvenir de son passage parmi nous de 1892 à 1897, année où il a dû, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, donner sa démission.

Nous avons été avisés, en effet, par Me A. PRUD'HOMME, notaire à Paris, que P. THIERRY-MIEG a légué à la Société, par testament olographe en date du 4 septembre 1916, sa bibliothèque entomologique « presque exclusivement composée de livres et brochures sur les Lépidoptères, ainsi que la vitrine qui la contient ».

La Société, très touchée de cette disposition dernière de notre ancien collègue, vote à l'unanimité l'acceptation du legs Thierry-Mieg. Elle donne en même temps à son Trésorier, M. Ch. LAHAUSSOIS, pleins pouvoirs pour la représenter, fournir toutes pièces utiles, prendre possession du legs et en donner décharge.

Rapport du Conseil, relatif aux ouvrages prêtés. — Dans sa réunion du 22 janvier 1917, le Conseil s'est occupé de la question des membres de la Société qui n'ont pas rendu en temps voulu les ouvrages empruntés par eux à la Bibliothèque et n'ont pas répondu aux réclamations qui leur ont été adressées directement d'abord et ensuite par la voie du *Bulletin*.

Le Conseil, en conséquence, propose : 1° de surseoir à toute démarche nouvelle en ce qui concerne les membres mobilisés; 2° d'adresser une réclamation pressante, par voie amiable, à plusieurs membres dont la bonne volonté n'est pas douteuse; 3° de mettre trois des membres particulièrement en retard en demeure de restituer, à bref délai, les ouvrages qu'ils conservent encore, faute de quoi des mesures de coercition pourront être prises.

— Les conclusions du Conseil sont adoptées à l'unanimité par la Société.

Commission du prix Dollfus 1916 (Rapport). — Au nom de la Commission du prix Dollfus, M. le Dr Ét. Rabaud donne lecture du rapport suivant :

Réunie le 15 janvier, la Commission du Prix Dollfus (1) n'a été saisie d'aucune candidature ; il lui a semblé néanmoins qu'elle devait chercher à attribuer le Prix pour 1916, et à l'attribuer en s'inspirant à la fois de l'esprit du règlement et des conditions présentes. Après avoir examiné plusieurs solutions, la Commission, à l'unanimité, a arrêté son choix sur les travaux de M. Auguste Lameere relatifs aux Prionides, dont une partie a paru, cette année même, dans le *Bulletin de la Société entomologique* et dans le *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*.

Cette œuvre, fort importante, renferme une étude complète du groupe des Prionides, tant au point de vue systématique qu'au point de vue de la Biologie générale. La Révision systématique porte sur plus de 600 espèces, dont plusieurs nouvelles, presque toutes décrites sur le *type* même ou le co-*type*. Les tableaux dichotomiques facilitent les déterminations et permettent d'embrasser d'un coup d'œil l'évolution des formes. En effet, outre la délimitation stricte des espèces, l'auteur a eu le souci constant de rechercher leur généalogie, estimant que la connaissance précise de l'enchaînement des organismes doit conduire à tirer des conclusions générales relatives à divers problèmes biologiques. C'est ainsi qu'il a été conduit à étudier l'évolution des

(1) Étaient présents : J. Berlioz, A. Bourgoin, P. Dumée, E. Dongé, J. de Gaulle, J. de Joannis, C. Pierre, Ét. Rabaud. — Excusé : M. Ch. Alluaud.

caractères sexuels secondaires des Prionides, d'une part, tandis que d'une autre, il a approfondi l'étude de la répartition géographique, établissant ainsi un rapport entre l'évolution des espèces et leurs migrations.

La caractéristique essentielle de cette œuvre est donc de mettre en valeur toute l'importance de la systématique, en faisant ressortir ce à quoi doivent conduire des descriptions morphologiques très exactes, appuyées sur un ensemble de données biologiques.

En conséquence, votre Commission a pensé qu'elle ne pouvait mieux faire que de proposer pour le Prix Dollfus le travail de M. Auguste Lameere, professeur à l'Université de Bruxelles (1).

Admission. — M. Georges Pécoud, 17, rue de Jussieu, Paris Ve. — *Coléoptères paléarctiques, principalement Carabidae.*

Portrait de J. Pérez. — M. Ch. Pérez, actuellement mobilisé, a profité de son passage à Paris pour faire don à la Société d'un très beau portrait de son père, J. Pérez, notre regretté membre honoraire.

La Société lui en exprime sa très vive gratitude.

Observations diverses.

Figure de **Sturmia semitestacea** *Villen.* [Dipt.] *et note sur ses mœurs.* — Notre collègue M. Cl. Pierre a bien voulu exécuter et offrir à la Société la figure, encore inédite, du *Sturmia semitestacea* Villen., Tachinaire parasite de *Cirina Forda* Westw., Lépidoptère Saturnide, de l'Afrique orientale australe.

Long. 15 mm.

L'insecte parasite a été obtenu d'une chrysalide de *Cirina* et est éclos à Paris, chez M. E. Moreau ; il fait partie de la collection Cl. Pierre.

(1) Le vote pour le prix Dollfus 1916 aura lieu à la séance du 21 mars 1917. Tous les *membres français* ont droit de prendre part à ce vote, qui aura lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, soit directement, soit par correspondance. Dans ce dernier cas, l'enveloppe fermée, contenant le bulletin de vote et signée *très lisiblement* par le votant, devra parvenir au siège de la Société, 28, rue Serpente, au plus tard le 21 mars à 8 heures du soir.

Le *Sturmia semitestacea* a été décrit par le Dr J. Villeneuve dans les *Annals of the South African Museum* [1916], p. 477. On ignorait jusqu'ici son genre de vie.

Communications.

Diagnoses préliminaires de Cétonides nouveaux recueillis par M. R. Vitalis de Salvaza en Indo-Chine, 2e note (1)

[Col. Scarabaeidae]

par A. Bourgoin.

1. **Macronota elegantula**, n. sp. — *M. Argodi* Bourgoin *vicina, sed brevior. Fronte medio nigra, carinata, lateribus ochraceo-squamosis, fulvo-pilosis; clypeo fulvo-piloso, nigro, nitido, dense punctato,* ♂ *fere toto ochraceo-squamoso; pronoto nigro, opaco, dense punctato, fulvo-piloso, ochraceo-trivittato, vitta mediana lata, antice furcata; scutello nigro, opaco, medio ochraceo-squamoso; elytris flavo-testaceis, unicostatis, sexstriatis, nigro-fasciatis; pygidio nigro, fulvo-piloso, fere toto ochraceo-squamulato; corpore subtus nigro, lateribus ochraceo-squamosis, rufo-pilosis; femoribus tibiisque longius pilosis; tibiis intermediis extus medio* ♂ *vix visibiliter,* ♀ *fortiter unidentatis.*

Haut-Tonkin : Chapa.

Types : 2 ♂, 1 ♀ (coll. R. Vitalis et A. Bourgoin).

2. **Macronota Garnieri**, n. sp. — ♀. *Tota nigra, sordide squamoso-maculata, flavo-pilosa, supra opaca, subtus nilida. Capite parce piloso, fronte rugoso-punctata, medio carinata; clypeo rugoso-punctato, antice leviter emarginato; pronoto creberrime, sat grosse punctato, dense piloso, squamoso-trivittato, vitta mediana lata, ad basin rotundata, antice furcata; scutello squamoso, punctato, piloso; elytris pubescentibus, quinquestriatis, ad suturam squamosis, lateribus trimaculatis; pygidio macula media rotundata ornato; pectore lateribus squamosis, longius pilosis; segmentis ventralibus convexis, pilosis, punctatis, 1-4 lateraliter a medio squamulatis; pedibus brevius pilosis, tibiis anticis extus tridentalis, intermediis et posticis medio fortius spinosis.*

Laos : Kam-Kent, 7 octobre 1915.

Type : une femelle (coll. A. Bourgoin).

(1) Voir *Bull. Soc. ent Fr.* [1916], p. 297.

3. **Ingrisma Mayi**, n. sp. — ♀. *I. nasutae* Fairm. *vicina, sed minor et gracilior. Capite olivaceo, medio sat convexo, dense punctato, lateribus apiceque grosse punctatis, clypeo antice dilatato, brunneo, reflexo; pronoto olivaceo, disco fere laevi, lateribus minute et dense punctatis; scutello olivaceo, fere laevi; elytris testaceo-viridibus, subseriato-punctatis; sutura, marginibus apiceque olivaceis; pygidio rubro-brunneo, transversim striolato, rugoso, rufo-piloso; processu mesosterni elongato; metasterno viridi, medio laevi, lateribus obsolete punctatis; segmentis ventralibus medio laevibus, lateribus obsolete punctatis, 1-2 viridibus, 3-6 viridi-rufescentibus, ultimo rufo, transversim striolato; femoribus rufis, haud pilosis, tibiis fusco-olivaceis, intus brevius rufo-pilosis, tarsis nigris.*

Laos : Pak-Lay (A. May).

Type : une femelle (coll. A. Bourgoin).

4. **Rhomborrhina nitida**, n. sp. — ♂. *R. Fortunei* Saund. *similis, sed longior et nitidior. Elytris haud pubescentibus, tibiis concoloribus, abdominis ultimo segmento haud nigro.*

Tonkin : Hagiang.

Types : 5 ♂ (coll. R. Vitalis et A. Bourgoin).

5. **Rhomborrhina nigriventris**, n. sp. — ♀. *R. distinctae affinis sed minor. Supra viridi-aurata, elytris ab basin lineato-punctatis, a medio rugoso-punctatis, punctis plurimis arcuatis, transversis, pupillatis; apicibus rugosis, spinosis, concoloribus, haud nigris; pectore medio abdomineque nigris, nitidis.*

Haut-Tonkin : Chapa, 27 mai 1916.

Type : une femelle (coll. A. Bourgoin).

6. **Rhomborrhina sapphirata**, n. sp. — ♀. *R. Chatanayi* Bourg. *vicina, sed gracilior, cyanea. Fronte inter oculos rugosa, clypeo rugoso; pronoto valde alutaceo, dense ac regulariter punctato; elytris disco minutissime punctatis, lateribus apiceque punctato-striolatis, sutura nigra; pygidio rugoso, apice rufo-piloso, tibiis tarsisque nigris, pedibus posticis haud pilosis.*

Haut-Tonkin : Viétri, mai 1915.

Type : une femelle (coll. A. Bourgoin).

7. **Cetonia** (**Potosia**?) **chalcitis**, n. sp. — ♀. *Elongata, cuprea, supra opaca, leviter olivacea, subtus nitida. Capite cupreo, nitido, sat grosse punctato, clypeo antice vix emarginato; pronoti disco obsolete punctato, albo-guttulato, lateribus striolatis, marginatis; scutello im-*

punctato; elytris albo-maculatis, disco antice fere laevi, postice leviter depressis, bicostatis, arcuato-signatis, lateribus sat grosse punctatis, angulis posticis fere rectis, haud spinosis; pygidio transversim striolato, rufo-piloso; processu mesosterni leviter transverso, antice rotundato; metasterno medio laevi, lateribus striolatis, griseo-pilosis, angulis posticis albo-signatis; segmentis ventralibus 1-2 medio laevibus, 3 parce, 4 sat dense, 5 dense, 6 rugose punctatis; lateribus arcuato-signatis, griseo-pilosis, albo-maculatis; pedibus griseo-pilosis.

Laos : Xieng-Khouang, 10 juillet 1916.

Type : une femelle (coll. A. Bourgoin).

8. **Cetonia** (**Protaetia**?) **albovermiculata**, n. sp. — ♂. *Rubrocuprea, leviter olivacea, supra opaca, subtus sat nitida. Fronte plana, sparse punctata, opaca, utrinque, ad oculos, albo bipunctata, clypeo ad basin opaco, parce punctato, antice nitido, dense punctato, vix emarginato, angulis anticis fere rectis; pronoto linea media impunctata, lateribus dense punctatis, marginatis; scutello laevi, epimeris sat crebre punctatis; elytris post medium subtiliter punctatis, albo-vermiculatis, angulis posticis rectis, haud spinosis; pygidio vix visibiliter punctato-striolato, medio convexo, lateribus depressis, minute griseo-maculatis; processu mesosterni fortiter transverso, antice angulato, metasterno medio laevi, sulcato, lateribus striolatis, griseo-pilosis, minute squamosis; segmentis ventralibus haud depressis, 1-5 fere opacis, lateribus parce punctatis et griseo-pilosis, ultimo nitido, medio laevi; pedibus nitidis, longius griseo-pilosis, tibiis anticis extus tridentatis, intermediis et posticis medio extus unidentatis.*

Haut-Tonkin : Chapa, 25 mai 1916.

Type : un mâle (coll. A. Bourgoin).

9. **Protaetia rubrocuprea**, n. sp. — ♂. *P. inani* Wallace *vicina, sed longior. Tota rubro-cuprea, supra opaca, velutina, subtus nitida. Propygidio producto, angulato, pygidio sat dense striolato, apice vix striolato.*

Tonkin : Hagiang (n° 1065).

Type : un mâle (coll. A. Bourgoin).

Notes sur les *Philorea*, Coléoptères Ténébrionides de la Faune des Andes

par P. Lesne.

Le genre *Philorea*, qui appartient à la famille des Ténébrionides, tribu des *Physogasterini*, est remarquable notamment par les particularités sexuelles du mâle, chez lequel les sternites moyens de l'abdomen portent, au milieu, des brosses de spinules dressées, en forme de spatules ou d'incisives. Le facies des femelles rappelle celui des *Pimelia*, tandis que les mâles sont plutôt adesmiiformes.

Ce genre paraît être caractéristique de la faune péruvienne. On en connaît jusqu'à présent 4 espèces dont j'ai donné récemment un synopsis (1) en utilisant surtout les matériaux recueillis par M. le Dr Escomel. Les notes qui suivent compléteront les renseignements que l'on possède sur ces insectes encore très peu connus.

P. mucronata Lesne 1911. — Le British Museum possède 2 exemplaires de cette espèce (2), provenant d'Eten (Pérou), l'un recueilli par P.-O. Simons, l'autre ayant fait partie de la collection Fry. Un troisième individu appartenant au même établissement est un mâle étiqueté « Magellan », provenance qui me paraît des plus douteuses. Cet individu est privé de mucron prosternal, la saillie du prosternum se montrant seulement angulée au sommet lorsqu'on l'examine de profil.

La taille varie de 8 à 10,5 millimètres.

P. picipes Erichson 1834. — Recueillie pour la première fois sur les cendres volcaniques du plateau de Tacora par Meyen, puis trouvée par A. d'Orbigny sur les pentes de la vallée de Tacna, cette espèce existe aussi dans d'autres parties du Pérou méridional. M. le Dr Escomel a en effet adressé au Muséum d'Histoire naturelle un nid de *Latrodectus* (3) qu'il avait recueilli à la ferme Urcunimuni, dans le département de Puno; de ce nid, farci, comme à l'ordinaire, de cadavres d'insectes et notamment de Coléoptères, j'ai extrait une femelle d'assez grande taille (11 mm.) appartenant à l'espèce actuelle. Un autre nid du même *Latrodectus* provenant des environs d'Arequipa m'a fourni un mâle du même *Philorea*.

(1) *Bulletin du Muséum d'Histoire naturelle*, [1911], n° 5, p. 292.

(2) J'en dois la communication à l'obligeance de M. Blair.

(3) Ce *Latrodectus* est très probablement, d'après M. Eugène Simon, le *L. mactans* F. (*formidabilis* Walck.), espèce redoutée pour sa piqûre dans l'Amérique du Sud où elle est largement répandue.

P. setipennis Lesne 1911. — Découverte aux environs d'Arequipa par M. le Dr Escomel, cette espèce paraît être abondante dans la région. A en juger par les deux nids de *Latrodectus* envoyés par lui, c'est le *P. setipennis* qui constitue la proie principale de cet Aranéide tant à Arequipa qu'à la ferme Urcunimuni dans le département de Puno. Le premier nid en contenait 32 cadavres (18 ♂, 14 ♀) et le second 22 (16 ♂ et 6 ♀). — (1).

Chez le *P. setipennis*, le bord antérieur de l'épistome est tantôt tronqué, tantôt largement et faiblement émarginé. La ponctuation de pronotum, généralement très fine au milieu et râpeuse sur les côtés, est quelquefois assez forte même au milieu. Le lobe prosternal est très rarement privé de mucron. J'ai vu un mâle dont le 1er sternite abdominal présentait exceptionnellement au milieu quelques spinules spatuliformes. Malgré sa variabilité, l'espèce est toujours aisément reconnaissable. Sa taille varie de 7 à 12,5 mm. (♂ 7-10 mm.; ♀ 10-12,5 mm.). — (2).

Trois nouvelles espèces de *Scraptia* Latr., de Madagascar

[Col. Heteromera]

par Maurice Pic.

Scraptia (Trotommideomorpha) Donckieri, n. sp. — *Oblongo-elongata, griseo-pubescens, parum nitida, testacea; thorace distincte impresso, elytris antice subdepressis,*

Oblong-allongé, orné d'une pubescence grise assez serrée sur l'avant-corps, un peu brillant, testacé. Tête subarquée, densément ponc-

(1) Les cadavres sont réduits à un squelette chitineux très fragile dont les pièces se séparent les unes des autres dès qu'on cherche à extraire les insectes de leur maillot de soie. Il semble que l'Aranéide injecte dans le corps des Coléoptères un ferment digestif puissant qui dissout complètement les parties molles et membraneuses.

Outre les *Philorea*, on trouve dans les toiles du Lathrodecte d'autres Ténébrionides (*Scotobius*, *Psammeticus*, *Praocis*), des Méloïdes (*Pseudomeloe humeralis* Guér.), des Scarabéides (*Trox*, ? *Phyllognathus*), des Vespides, des Fourmis, des Lépidoptères nocturnes, des Scorpionides, des Oniscides, etc.

(2) La quatrième espèce connue du genre *Philorea* est le *P. Escomeli* Lesne 1911, qui habite les environs d'Arequipa.

tuée, yeux un peu éloignés du bord postérieur de la tête; antennes peu longues, assez robustes. Prothorax transversal, diminué en avant, nettement impressionné de chaque côté et plus longuement au milieu, densément ponctué. Écusson grand. Élytres à peine plus larges que le prothorax, longs, rétrécis et subarrondis au sommet, marqués d'une dépression basale distincte, à ponctuation granuleuse, forte et peu serrée. — Long. 3 mm.

Madagascar : Tananarive.

Acquis de M. H. Donckier, ainsi que l'espèce suivante.

Voisin de *S. antennata* Pic; en diffère par les antennes entièrement testacées, le prothorax fortement et longuement impressionné sur le disque, les élytres plus longs.

Scraptia tananarivana, n. sp. — *Sat elongata, subparallela, griseo-pubescens, nitida, testacea, abdomine brunnescente, thorace distincte impresso.*

Assez allongé, subparallèle, orné d'une pubescence grise assez serrée, brillant, testacé, abdomen brunâtre. Tête subarquée, densément ponctuée; yeux rapprochés du bord postérieur de la tête. Prothorax transversal, arqué en avant, nettement triimpressionné à la base, densément ponctué. Élytres peu plus larges que le prothorax, longs, subparallèles, atténués à l'extrémité et subarrondis au sommet, sans dépression basale transversale, assez fortement ponctués. — Long. 3 mm.

Tananarive.

Ressemble beaucoup à *S. hovana* Pic, mais les yeux sont moins rapprochés du bord postérieur de la tête et moins gros, le prothorax est moins brillant et faiblement impressionné au milieu.

Scraptia apicicornis, n. sp. — *Oblongo-elongata, griseo-pubescens, nitida, pallido-testacea, capite pectoreque pro parte rufescentibus, antennarum ultimo articulo nigro.*

Oblong-allongé, orné d'une pubescence grise rapprochée, brillant, testacé pâle avec la tête et la poitrine en partie roussâtres, les yeux et le sommet des élytres noirs. Tête longue et étroite, arquée derrière les yeux qui sont très éloignés de son bord postérieur; antennes courtes. Prothorax court, assez rétréci en avant, densément ponctué, à peine impressionné de chaque côté sur sa base. Écusson petit. Élytres un peu plus larges que le prothorax, subparallèles, un peu atténués à l'extrémité, densément ponctués. — Long. 5 mm.

Madagascar : Annanarive (Sikora in coll. Pic).

Peut se placer près de *S. anaspina* Fairm.; s'en distingue facilement par l'extrême sommet des antennes noir et la tête longue.

Deux Hyménoptères nouveaux pour la faune française

par J. de Gaulle.

Parmi les espèces à ajouter au Catalogue des Hyménoptères de France, je crois devoir signaler les deux suivantes qui, fort rares et appartenant à des genres peu connus, ajoutent une contribution intéressante à la connaissance de notre faune :

Troctocerus elegans Woldstedt. — On ne connaissait jusqu'à présent qu'un exemplaire mâle de ce joli petit Ichneumonide de la sous-famille des *Pimplinae*; il avait été capturé en Silésie, aux environs de Breslau; ses mœurs étaient inconnues.

J'ai eu le plaisir de trouver deux autres mâles dans un lot d'Hyménoptères parasites communiqués par M. J. de Joannis. Notre collègue les avait obtenus de galles de *Parapodia sinaica* Frnfld recueillies à Marseille par M. J. Cotte sur les *Tamarix*.

Il serait à désirer que de nouveaux élevages permettent d'obtenir la femelle de cette espèce; car faute de la connaître on reste incertain sur la place exacte du genre *Troctocerus*, fondé uniquement sur les caractères, exceptionnels il est vrai, du seul sexe mâle.

Eucremastus brevicornis Szepligeti. — Cet Ophionide de la tribu des *Cremastini* a été décrit, genre et espèce, par Szepligeti en 1905 d'après un exemplaire venant de Murcie (Espagne). J'en possède deux autres exemplaires recueillis l'un par feu F. Lombard à Serres (Hautes-Alpes), l'autre par M. A. Méquignon à Perrusson (Indre-et-Loire).

La collection Sichel en contient également un exemplaire de Nice.

Bulletin bibliographique.

CHAMPION (G.-C.) : The Percy Sladen trust expedition to the Indian ocean in 1905, under the leadership of Mr. J. Stanley Gardiner. V, N° 19. Coleoptera, Curculionidae. (*Trans. Linn. Soc. London*, XVI, 4 [1914], p. 393-497, pl. 22-24.)*

ID. : On new exotic Scraptiina. (*Ent. Monthly Mag.*, (3) II [1916], p. 233-274, pl. 7.)*

ID. : New Xylophilids from Australia, India and Borneo (*loc. cit.*, (3) III [1916], p. 1-4.)*

ID. : Notes on the Coleoptera recorded from « Resin Animé » by the Rev. F. W. Hope (*loc. cit.*, p. 7-8.)*

ID. : On new or little-known Lagriidae and Pedilidae. (*Trans. ent. Soc. London*, [1916], p. 181-242, pl. 63-64.)*

DODERO (A.) : Appunti coleotterologici, II. (*Ann. Mus. civ. Genova*, (3) VII [1916], p. 337-354.)*

NIELSEN (J.-C.) : Undersogelser over entoparasitiske Muscidelarver hos Arthropoder. VI. (*Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Foren.*, LXVIII [1916], p. 23-36) fig., 2 pl.*

OBST (P.) : Die von Herrn Dr. L. Schultze in Süd- und Südwestafrika gesammelten Carabiden. (*Mediz.-naturwiss. Gesellsch., Iena*, XIII [1908], p. 85-92). — Don de M. A. Grouvelle.

ID. : Berichtigung zu *Anthia betschuana*, n. sp. (*loc. cit.*, p. 92[a]-92[b]). — Id.

RITSEMA (C.) : Four new species of the Melolonthid genus *Apogonia* from Borneo (*Notes Leyd. Mus.* XXV, p. 103-109.) — Id.

Arkiv för Zoologi, X [1916], 1-3. — Results of Dr. E. Mjöbergs Swedish scientific expeditions to Australia 1910-1913. — 1. BOUVIER (E.-L.) : 3. Onychophora; 23 p., 1 pl. — 2. KRAEPELIN (K.) : 4. Scolopendriden und Skorpione; 43 p., fig. — 3. ROTHSCHILD (C.) : 5. Siphonaptera; 9 p., fig. — 4. ULMER (G.) : Ephemeroptera; 18 p., fig. — 5. BERNHAUER (M.) : 7. Staphyliniden; 7 p., fig. — 6. MJÖBERG (E.) : 8. Ptinidae; 15 p., fig. — 10. ID. : 9. Cicindelidae, Gyri-

nidae, Lucanidae, Paussidae; 16 p., fig. — 13. Ulmer (G.) : 10. Trichoptera; 23 p., fig. — 20. Weise (J.) : 11. Chrysomeliden und Coccinelliden aus West-Australien; 51 p., 1 pl. — 14. Aurivillius (C.) : Diagnosen neuer Lepidopteren aus Afrika; 16 p. — 15. Esben-Petersen (P.) : Notes concerning African Myrmeleonidae; 22 p., fig. — 16. Björck (W.) : Bidrag till kännedomen om Kattegats fauna. I. Crustacea; 14 p., 1 pl. — 17. Roman (A.) : Ichneumoniden aus den Färöern; 16 p., fig. — Id. : Ichneumoniden aus West-Grönland; 12 p. — 19. Aurivillius (C.) : Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia, 16; 25 p., 1 pl.

Entomologist's Monthly Magazine (*The*), LIII [1916]. — Champion (G.-C.) : On new exotic Scraptiina (fin); p. 265, pl. 7. — Meyrick (E.) : *Phalonia manniana* and its allies; p. 275. — Bayford (E.-G.) : Notes on the Stephensian records of *Psylliodes cyanoptera* Ill.; p. 278. — Britten (H.) : Hemiptera in Cumberland; p. 278. — Id. : *Psallius vitellinus* in Oxfordshire; p. 279. — Merton (K.-J.) : *Limnophilus fuscinervis* in Co. Monaghan; p. 279. — Ling Roth (H.) : An exotic Blattid, *Rhyparobia maderae* Fabr. in Yorkshire; p. 279. — Rothschild (N.-C.) : The occurrence of *Xenopsylla cheopis* Roths. in Bristol; p. 279.

— LIII [1917]. — Champion (G.-C.) : New Xylophilids from Australia, India and Borneo; p. 1. — Id. : Notes on the Coleoptera recorded from « Resin Animé » by the Rev. F. W. Hope; p. 7. — Id. : Coleoptera, Hemiptera, etc., in Devonshire; p. 14. — Janson (O.-E.) : Descriptions of two new species of Cetoniidae; p. 5, fig. — Pierce (F.-N.) : Occurrence in England of *Parornix finitimella* Z. a species of Gracilariadae new to British list; p. 9. — Perkins (R.-C.-L.) : On a new species of *Psammochares* (or *Pompilus*) in England; p. 10. — Id. : *Nomada bucephalae* n. n. for *N. lateralis* Sm. (nec Panz.) and notes on *N. conjungens* H. Sch.; p. 12. — Rowland Brown (H.) : Wicken fen; p. 13. — Hallett (H.-M.) : *Claviger longicornis* Müll. in Glamorgan; p. 15. — Thouless (H.-J.) : *Lytta vesicatoria* L. in Norfolk; p. 15. — Id. : *Psylliodes cyanoptera* Ill. at Thetford; p. 15. — Thompson (F.) : Coleoptera found in two consecutive bags of Thames flood rubbish; p. 15. — Scott (H.) : A note on *Vespa sylvestris*; p. 17. — Box (H.-E.) : Two interesting ants in Essex; p. 17. — Edwards (J.) : On *Rhynchites ophthalmicus* Steph. with a table of the British species; p. 22.

Entomological News, XXVIII [1917], 1. — Rich (S.-G.) : *Zonocerus elegans* (Orth.); p. 1. — Knight (H.-H.) : New and noteworthy

forms of North American Miridae (Hem.); p. 3, fig. — WILLIAMSON (E.-B.) : Correction of the specific name of a dragonfly (Odon.); p. 8. — KENNEDY (C.-H.) : Notes on the penes of danaselflies (Odon.); p. 9, pl. 2-3. — DUNN (L.-H.) : A simple method of identifying the *Anopheles* mosquitoes of the Canal zone; p. 14. — GIRAULT (A.-A.) : New Chalcid flies from Maryland; p. 20. — WEISS (H.-B.) : Unusual orchid insects; p. 24, pl. 4-5. — OTTOLENGUI : Distribution and synonymy of *Autographa vaccinii* Hy. Edw. (Lep.); p. 29. — WIRTNER (M.) : A new genus of Bothynotinae, Miridae (Heter.); p. 33. — RIPLEY (L.-B.) : Notes on the feeding habits of adult Chrysopidae (Neur.); p. 35. — PARSHLEY (H.-M.) : A species of *Macrotracheliella* found in New England (Hem.); p. 37. — WEISS (H.-B.) et DICKERSON (E.-L.) : *Psyllia buxi* Linné in New Jersey (Homopt.); p. 40.

Entomologist's Record and Journal of Variation (The), XXVIII [1916], 12. — SHELDON (W.-G.) : The male ancillary appendages of European species of the *Athalia* group of the genus *Melitaea*; p. 261, pl. 3-5. — ASHLEY (E.-B.) : Notes on entomology, etc., in England, 1916; p. 264. — MUSCHAMP (P.-A.-H.) : Gynandromorphism in a mongrel brood of *Lymantria dispar* and its race var. *japonica*; p. 270. — CRAWLEY (W.-C.) : The alate females of the ant-aphis *Forda*; p. 272, pl. 6. — BOWATER (W.) : Random notes from France; p. 273. — DONISTHORPE (H.) : Synonymy of some genera of ants; p. 275.

Entomologist (The), L [1917]. — MOULTON (J.-C.) : New species of Cicadidae from Sumatra; p. 1. — BAGWELL-PUREFOY (E.) : Notes on the life history of *Gonopteryx Cleopatra*; p. 3. — RATTRAY (R.-H.) : Notes on the larval and pupal stages in some of the Sesiidae; p. 5. — GURNEY (G.-H.) : Two days collecting in Lancashire and Cumberland; p. 7. — SOWERBY (F.-W.) : Notes from Cairo; p. 9. — SMART (H.-D.) : Notes on some of the Lepidoptera of the British Line in France; p. 11. — ROWLAND-BROWN (H.) : Unusual food plant of *Acherontia atropos*; p. 16. — ID. : The hibernation of *Lampides baeticus*; p. 18.

Insecta, V [1915]. — BORDAS (L.) : Nouvelles recherches sur les glandes rectales des papillons; p. 137, fig. — ID. : Morphologie de l'appareil digestif de quelques Noctuides; p. 162, fig. — POUILLAUDE (J.) : Diagnoses de quelques Cétonides de Madagascar; p. 156. — LONGIN NAVÁS : Les Myrméléonides d'Europe et des contrées limitrophes (suite); p. 176, fig.

Maine Agricultural Experiment Station (*Bulletin*), 1916. — 248. Osborn (H.) : Life histories of leafhoppers of Maine; p. 53-80, fig.; 5 pl.

New York Agricultural Experiment Station. 1° Bulletin 1916. — 402. Parrot (P.-J.) et Hodgkiss (H.-E.) : The status of spraying practices for the control of plant lice in apple orchards; p. 193-210, 2 pl. — 415. Parrott (P.-J.), Hodgkiss (H.-E.) et Lathrop (F.-H.) : Plant-lice injurious to apple orchards; p. 11-53, 8 pl. — 419. Schoene (W.-J.) : The cabbage maggot : its biology and control; p. 99-160 fig., 5 pl.

— 5° *Technical Bulletin*, 1916. — 50. Gloyer (W.-O.) et Fulton (B.-B.) : Tree crickets as carriers of Leptosphaeria coniothyrium (Fckl.) Sacc. and other fungi; p. 1-22, 4 pl.

Novitates Zoologicae, XXIII [1916], 3. — Rothschild (Lord) : Notes on Amathusiidae, Brassolidae, Morphidae, etc., with descriptions of new forms; p. 299, pl. 3-6. — Id. : On the Lepidoptera in the Tring Museum sent by Mr. A. S. Meek from the Admiralty islands, Dampier and Vulcan islands; p. 319. — Jordan (K.) : On the Oriental Anthribid genus *Apolecta*; p. 342. — Id. : On the species of *Somabrachys* in the Tring Museum; p. 350, pl. 7-8. — Id. : Anthribidae collected by M. Vitalis de Salvaza in French Indo-China; p. 359, fig.

Societa Entomologica Italiana (*Bullettino*), XLVII [1915]. — Giglio-Tos (E.) : Mantidi esotici; p. 3. — Verity (R.) : Faunulla della provincia di Macerata (Marche); p. 45. — Emery (C.) : Fauna entomologica Italiana. I. Hymenoptera. Formicidae; p. 79, fig.

Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales (*Boletin*), XV [1916], 9-10. — Lacroix (J.-L.) : Notes névroptérologiques. VI. Captures diverses et formes nouvelles; p. 211.

Société d'Agriculture, Sciences et Industrie de Lyon (*Annales*) [1914-1915], Lyon, 1916.⊙

Société Entomologique d'Égypte (*Bulletin*), [1916], 1. — Alfieri (A.) : Observations sur *Sphenoptera trispinosa* Klug, p. 15. — Id. : Les parasites de *Sesbania aegyptiaca*; p. 22. — Gough (L.) . Notes on a machine to kill *Gelechia* larvae by hot-air and the effects of the heat on *Gelechia* larvae and cotton-seed; p. 22.

Société Philomathique de Paris (*Bulletin*), (10) VIII [1916]. — HENNEGUY (L.-F.) : La langue française et les savants; p. 17.

Spolia Zeylanica, X [1916]. — SOLOMONS (C.-C.) : Cassia nodosa tree defoliated by caterpillars of *Catopsilia pomona* Fabr.; p. 281. — ID. : Flight of *Brana callopasa*; p. 282. — ORMISTON (W.) : *Nacaduba dana*, de Niceville (Lep.); p. 282. — ID. : *Terias rotundalis* Moore (Lep.); p. 283.

Stavanger Museum Aarshefte, XXVI [1915]. — I. HELLIESEN (T.) : Stavanger amts Coleoptera fortsat fra Stavanger Museums aarshefte 1914; p. 1-88. — II. JENSEN (F.) : Stavanger amts Odonater; p. 1-8, fig.

Linnean Society of London. 1° *Journal*, XXXIII [1916]. — GILCHRIST (J.-D.-F.) : Larval and postlarval stages of *Jasus Lalandii* Milne Edw.; p. 101, fig., pl. 12-17. — TILLYARD (R.-J.) : A study of the rectal breathing-apparatus in the larvae of Anisopterid dragonflies; p. 127, fig., pl. 18-22. — COLLINGE (W.-E.) : Description of a new species of *Idotea* (Isop.) from the sea of Marmara and the Black Sea; p. 197, pl. 23.

— 2° *Proceedings* (*128th session*), novembre 1915 à juin 1916. — POULTON (E.-B.) . The heriditary transmission of small variations and the origin of butterfly mimicry; p. 21-52, pl. 1.

Michigan Academy of Science (*Report*), 1914. — SCHULL (A.-F.) : Parthenogenosis in *Anthothrips verbasci*; p. 46. — HEGNER (R.-W.) : Experimental studies on the relations between the structure and development of the eggs of Chrysomelid beetles; p. 49.

Museo National de Historia Natural de Buenos-Aires (*Anales*), XXVIII [1916]. — MARELLI (C.-A.) : Las diferentes larvas de langostas que acompañan a las grandes magas de la saltona de *Schistocera paranensis* Burm.; p. 345-390.

Tijdschrift voor Entomologie, [1916]. — MEIJERE (J.-C.-H. DE) : Studien über südostasiatische Dipteren XII; p. 225, pl. 9. — MEUNIER (F.) : Sur quelques Diptères (Bombylidae, Leptidae, Dolichopodidae, Conopidae et Chironomidae de l'ambre de la Baltique; p. 274, fig. — ROEPKE (W.) : Eine neue Dryinidae aus Java (*Phanerodryinus javanus* n. g., n. sp.); p. 287. — MEIJERE (J.-C.-H. DE) : Tweede Supplement op de nieuwe Naamlijst van Nederlandsche Diptera; p. 293.

U. S. Department of Agriculture, [1916]. — 1° *Bulletin*. — 382. COAD (B.-R.) : Cotton boll-weevil control in the Mississipi; 12 p. — 408. COOK (F.-C.) : Experiments during 1915 in the destruction of fly larvae in horse manure; 20 p. — 419. STRAUSS (J.-F.) : The grape leaf-folder; 16 p., fig., 4 pl. — 421. WHITE (W.-H.) : The sugar-beet thrips; 12 p., fig. 2 pl. — 422. — JONES (T.-H.) : The eggplant tortoise beetle; 8 p., fig. — 424. MILLIKEN (F.-B.) : The cotton-wood borer; 7 p., fig. 1 pl. — 435. LEACH (B.-R.) : The apple leaf-sewer; 16 p., fig., 1 pl. — 489. CARR (E.-G.) : A survey of beekeeping in North Carolina; 16 p.

2° *Journal of Agricultural Research* (*Reprinted from*). — K-38. WILDERMUTH (V.-L.) : California green lacewing fly; VI, p. 514-525, fig. — K-39. HOLLOWAY (T.-E.) : Larval characters and distribution of two species of *Diatraea*; VI, p. 621-625, pl. 89. — K-43. MC INDO (N.-E.) : Effects of nicotine as an insecticide; VII, p. 89-120, pl. 1-3. — K-44. URBAHUS (T.-D.) : Life history of *Habrocytus medicaginis* a recently described parasite of the chalcis fly in alfalfa seed; VII, p. 147-153, fig., pl. 4. — K-45. BAKER (A.-C.) et TURNER (W.-F.) : Rosy apple aphis; VII, p. 321-343, pl. 20-25. — K-46. QUAINTANCE (A.-L.) et WOOD (W.-B.) : *Lapeyresia molesta*, an important new insect enemy of the peach; VII, p. 373-377, pl. 26-31.

A. B.

Le Secrétaire-gérant : L. CHOPARD.

VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL
en Afrique Orientale (1911-1912)

Mémoires parus :

Liste des Stations : par Ch. ALLUAUD et R. JEANNEL, avec une carte.

Grottes de l'Afrique Orientale : par Ch. ALLUAUD et R. JEANNEL.

Crustacés : I, *Phyllopoda*, par E. DADAY DE DEÉS. — II, *Amphipoda*, par E. CHEVREUX.

Arachnides : I, *Opiliones*, par le Dr C.-Fr. ROEWER, avec 1 pl. n. — II, *Ixodidae*, par L.-G. NEUMANN. — III, *Araneae* (1re partie), par L. BERLAND.

Hémiptères : I, *Pentatomidae*, par le Dr R. JEANNEL, avec 4 pl. n. — II, *Naucoridae*, *Belostomidae* et *Nepidae*, par A.-L. MONTANDON.

Strepsiptères : par le Dr R. JEANNEL, avec 1 pl. n.

Coléoptères : I, *Pselaphidae*, par A. RAFFRAY. — II, *Onthophagini*, par H. D'ORBIGNY. — III, *Meloidae*, par M. PIC, avec 1 pl. col. — IV, *Hylophilidae* et *Anthicidae*, par M. PIC, avec 1 pl. n. — V, *Hybosorinae*, etc., par E. BENDERITTER, avec 1 pl. n. — VI, *Buprestidae*, par Ch. KERREMANS, avec 1 pl. col. — VII, *Lampyridae*, par E. OLIVIER. — VIII, *Hispinae*, par R. GESTRO, avec 1 pl. n. — IX, *Dascillidae*, etc., par M. PIC. — X, *Anthribidae*, par K. JORDAN. — XI, *Histeridae*, par H. DESBORDES. — XII, *Dynastinae*, par E. BENDERITTER, avec 1 pl. n.

Hyménoptères : I, *Proctotrupidae*, *Cynipidae*; etc., par J.-J. KIEFFER. — II, *Formicidae*, par le Dr F. SANTSCHI, avec 2 pl. n. — III, *Chrysididae* et *Vespidae*, par R. DU BUYSSON. — IV, *Braconidae*, par GY. SZÉPLIGETI.

Diptères : I, *Chironomidae* et *Cecidomyidae*, par J.-J. KIEFFER. — II, *Nematocera*, par F.-W. EDWARDS. — III, *Polyneura*, par P. RIEDEL. — IV, *Anthomyiidae*, par P. STEIN. — V, *Brachycera*, par Th. BECKER, avec 2 pl. n.

Lépidoptères : I, *Chenilles des galles*, par F. LE CERF, avec 2 pl. n.

Orthoptères : I, *Dermaptera*, par A. BORELLI, avec 2 pl. n. — II, *Mantidae*, par L. CHOPARD.

Pseudonévroptères : I, *Termitidae*, par V. SJÖSTEDT. — II, *Odonata*, par R. MARTIN, avec 3 pl. n.

Névroptères : *Planipennia*, etc., par L. NAVÁS.

Myriapodes : I, *Chilopoda*, par H. RIBAUT, avec 5 pl. n. — II, *Symphyla*, par H. RIBAUT, avec 2 pl. n.

Plancton du Victoria-Nyanza, par J. VIRIEUX, avec 2 pl. n.

Vers : *Turbellariés*, *Trématodes* et *Gordiacés*, par P. DE BEAUCHAMP, avec 1 pl. n. — II, *Oligochètes*, par MICHAELSEN, avec 1 pl. n.

Poissons du Victoria-Nyanza, par le Dr J. PELLEGRIN, avec 1 pl. n.

La publication est en dépôt à la Librairie des Sciences naturelles Léon LHOMME, 3, rue Corneille, Paris (VIe).

Librairie de la Société entomologique de France (*suite*).

Characters of undescribed Lepidoptera heterocera, par F. Walker. London, 1869, in-8°. . . . . 3 et 4 fr.

Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères d'Europe, in-8°, Moulins. (Extr. Rev. sc. Bourb.) :

I. *Nécrophages*, traduit de Reitter [par M.-J. Belon], 1890. . . . . 1 fr.

II. *Colydiides, Rhysodides, Trogositides* (traduit de Reitter), 1891. . . . . 0 fr. 50

Histérides nouveaux (*Description d'*), par S. de Marseul, in-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.). . . . . 1 50 et 2 fr.

Monographie de la famille des Eucnémides, par H. de Bonvouloir, Paris, Soc. ent. Fr., in-8° avec 42 planches gravées. . . . . 5 et 7 fr.

Essai sur la classification des Pyralites, par E.-L. Ragonot, in-8°, 276 p., 4 pl. color. (Extr. Ann. Soc. ent. Fr. 1890). . . . . 10 et 12 fr.

Le même, pl. noires. . . . . 4 et 6 fr.

Nouveaux genres et espèces de Phycitinae *et* Galleriidae, par E.-L. Ragonot, in-8°, 52 p. (Extr. Ann. Soc. ent. Fr. 1888). . . . . 3 et 4 fr.

Notes synonymiques sur les Microlepidoptères et description d'espèces peu connues ou inédites, par E. L. Ragonot, in-8°, 66 p., 1 pl. color. (Extr. Ann. Soc. ent. Fr. 1894). . . . . 4 et 5 fr.

Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltés par M. Ch. Delagrange, par E.-L. Ragonot, in-8°, 15 p. (Extr. Ann. Soc. ent. Fr. 1895). . . . . 1 50 et 2 fr.

Diagnoses of North American Phycitidae and Galleriidae, by E.-L. Ragonot, Paris, 1887, in-8°, 20 p . . . . . 1 50 et 2 fr.

Revision of British species of Phycitidae and Galleriidae, by E.-L. Ragonot, in-8°, 58 p. . . . . 2 fr. et 2 50

Catalogue des Phycitinae, par E.-L. Ragonot, in-4°, 52 p. (Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. l. n. d. 5 et 6 fr.

Genera et Catalogue des Psélaphides, par A. Raffray, in-8°, 621 p., 3 pl. (Extr. des *Ann. Soc. ent. Fr.*, 1903). 20 et 25 fr.

Pour les *Membres* de la Société, les offres d'échanges, demandes de communications ou de renseignements d'ordre *purement scientifique*, qui n'excéderont pas *cinq* lignes, seront insérées *gratuitement* dans deux numéros; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont pas *dix* lignes, elles coûteront 0 fr. 20 la ligne pour deux numéros.

La Société entomologique de France tient ses séances les 2e et 4e mercredis de chaque mois (excepté août et septembre), à 8 h. 1/2 du soir, au siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, *rue Serpente*.

Elle publie :

1° Les Annales de la Société entomologique de France (4 fascicules par an avec planches et figures);

2° Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colonies françaises, paient une cotisation annuelle de. . . . . 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient. . . . . 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans) qui paient une cotisation annuelle de. . . . . 5 fr.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie. Il n'a plus de cotisation à payer, reçoit *franco* les *Annales*, le *Bulletin*, et, *à titre de prime gratuite*, une série de dix volumes des *Annales* parmi ceux à *prix réduit* restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles et consécutives d'au moins 100 francs.

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les *mardis*, *jeudis* et *samedis*, de 3 heures à 6 heures 1/2; le *mercredi, de 8 à 10 heures 1/2 du soir*.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. DE MARSEUL, continué par la Société entomologique de France, publie spécialement des travaux sur les COLÉOPTÈRES de l'Ancien Monde.

M. L. BEDEL, *20, rue de l'Odéon*, est chargé de la publication du Journal (*examen et admission des mémoires et correspondance scientifique*).

Le montant des abonnements L'Abeille (à 10 fr. ou 12 fr. *par volume*) doit être adressé à M. J. MAGNIN, Bibliothécaire adjoint de la Société entomologique, *28, rue Serpente*.

COLLECTIONS

Collection H. Sénac (*Tenebrionidae paléarctiques*),
Collection Ch. Brisout de Barneville (*Coléoptères paléarctiques*),
Collection Vauloger (*Anthicidae, Malachiidae, Erodiidae*),
chez M. L. BEDEL, 20, rue de l'Odéon;

Collection H. de Peyerimhoff (*Microlépidoptères*),
Collection H. Brisout de Barneville (*Coléoptères d'Europe*),
Collection Aubé (*Coléoptères paléarctiques*),
Collection Capiomont (*Hyperidae, Lixus, Larinus*),
Collection Vauloger (*Helopidae*).
Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,
Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,
Collection Pandellé (*Diptères de France*),
Collection de Diptères de France, don de M. le Dr Gobert,
Collection A. Cheux (*Lépidoptères de France*),
Collection entomologique française de tous les ordres,
Collection d'exemplaires *typiques*,
au Siège social, 28, rue Serpente.

SOMMAIRE DU N° 2

Séance du 24 janvier 1917

Correspondance. — Changement d'adresse. — Legs Thierry-Mieg. — Rapport du Conseil relatif aux ouvrages prêtés. . 65
Commission du prix Dollfus 1916 (Rapport). — Portrait de J. Pérez. 66

Observations diverses

Figure inédite de *Sturmia semitestacea* Villen. [Dipt.], parasite d'un *Cirina* [Lep.]. 67

Communications

A. Bourgoin. — Diagnoses préliminaires de Cétonides nouveaux recueillis par M. R. Vitalis de Salvaza en Indo-Chine, 2e note [Col. Scarabaeidae]. 68
P. Lesne. — Notes sur les *Philorea*, Coléoptères Ténébrionides de la Faune des Andes 71
M. Pic. — Trois nouvelles espèces de *Scraptia* Latr., de Madagascar 72
J. de Gaulle. — Deux Hyménoptères nouveaux pour la faune française 74

Bulletin bibliographique 75

Pour la *correspondance scientifique*, les *réclamations* et les annonces s'adresser à :

M. le Secrétaire de la Société entomologique de France

28, rue Serpente, Paris, 6e.

TYPOGRAPHIE FIRMIN-DIDOT ET Cie. — PARIS.